

Aufstellung der Einzelversuche

Fortl. Nr.	Name der Studie	n/drop out
1.	Akute Irritation I (Unterarm)	20 /0
2.	Akute Irritation II (Unterarm)	20/0
3.	Offener u. geschl. RIT lipophile Hautirritanzen am Rücken	20/0
4.	RIT Glykolether	8/8
5.	Geschlossener RIT lipophile Irritantien und SLS	11/3
6.	11 tägiger KOIT ohne Wochenendpause, davon 6 mit HSP	20/0
7.	Verlaufskinetik mit Whitening (akute I.)	6/0
8.	5 min KOIT verkürzt Pilot	5/0
9.	12 tägiger kumulativer okklusiver Irritationstest mit 6 kommerziellen HSP	23/3
10.	Empfindlichkeitstestung mit Octan	29/0
11.	11 tägiger kumulativer okklusiver Irritationstest mit 4 kommerziellen HSP an Octanrespondern	21/0
12.	Repetitiver okklusiver Tandem-Irritationstest mit lipohilen Standardirritantien und SLS	29/2
13.	Vergleich der Irritationswirkung bei offener und geschlossener repetitiver Applikation von Cumol und Octan im Halbseitenvergleich (I)	10/0
14.	Vergleich der Irritationswirkung bei offener und geschlossener repetitiver Applikation von Cumol und Octan im Halbseitenvergleich (II) mit 2 kommerziellen HSP	6/0
15.	Repetitiver Irritationstest mit 8 Hautschutzexterna gegen Octan	11/0
	Gesamt	239